

BMF Milho (SET/17) US\$ 26,950 (-34,27%) DÓLAR (COMPRA) R\$ 3,27 (0,25%)

[ENTRE](#)[CADASTRE-SE \(/LOGIN\)](#)[\(//FALECONOSCO/\)](#)

(//)

[AGROLINKFITO](#)[\(/AGROLINKFITO/\)](#)[REGIONAL](#)[\(/REGIONAL/\)](#)[COTAÇÕES](#) ▾[\(/COTACOES/\)](#)[AGRICULTURA](#) ▾[NOTÍCIAS](#)[\(/NOTICIAS/\)](#)[VETERINÁRIA](#) ▾[AGROVENDA](#)[+ 7 SEÇÕES](#) ▾[AGROTEMPO](#)[\(/AGROTEMPO/\)](#)[CUNISTAS \(/CUNISTAS\)](#)[Colunas \(/colunistas/lista\)](#)[Autores \(/colunistas/autor/lista\)](#)[Minhas Colunas \(/colunistas/autor/minhas-colunas\)](#)[Criar coluna \(/colunistas/coluna/novo\)](#)**Agronegócio**

Pastagens degradadas na Amazônia Ocidental: causas e recuperação

Por: **Newton de Lucena Costa** [\(/colunistas/colunista/newton-de-lucena-costa_29368.html\)](#)

Publicado em 27/05/2007 às 16:10h.

**1596 ACESSOS**

Na Amazônia Ocidental, cerca de 10 milhões de hectares de florestas estão atualmente ocupados com pastagens cultivadas. Desta área, quase 40% já apresenta pastagens em diferentes estágios de degradação, o que reflete na necessidade contínua de novos desmatamentos, a fim de alimentar adequadamente os rebanhos, resultando numa pecuária itinerante. O desequilíbrio ecológico causado pelo desmatamento das florestas naturais para o estabelecimento de pastagens não adaptáveis aos tipos de solos da região pode ser considerado como o início do processo de degradação das pastagens. No preparo do solo e na queimada, todos os nutrientes não voláteis da biomassa florestal são incorporados ao solo sob a forma de cinzas, o que implica no aumento do pH e da fertilidade do solo, favorecendo o estabelecimento e crescimento das pastagens. No entanto, esta alta fertilidade é apenas temporária. O nitrogênio pode ser perdido por lixiviação, volatilização (transformação em gás) ou imobilização, um processo onde o nutriente torna-se inutilizável pela planta. Já, o fósforo, apesar de estar inicialmente presente quando a floresta é queimada, apresenta uma rápida e grande fixação deste nutriente na fração argilosa do solo, o que o torna indisponível para a planta, cuja

deficiência provoca declínios drásticos na produção de forragem e, conseqüentemente, no desempenho dos animais. Os níveis de cálcio, magnésio e potássio são grandemente aumentados pela queimada. Com a utilização de plantas forrageiras adaptadas, estes nutrientes podem ser mantidos em níveis aceitáveis por períodos de tempo relativamente longos.

Neste contexto, considerando-se que o nitrogênio e o fósforo são os nutrientes mais limitantes à produção de forragem, a manutenção de níveis satisfatórios desses nutrientes é de vital importância para quebrar a reação em cadeia do esgotamento do solo que causa a degradação das pastagens. O nitrogênio poderá ser suprido através da utilização de leguminosas forrageiras, uma vez que estas possuem a capacidade de fixação e incorporação do nitrogênio atmosférico ao solo, as quais podem variar entre 50 e 300 kg/ha/ano de nitrogênio. Quanto ao fósforo, trabalhos conduzidos na Amazônia Ocidental demonstram que a aplicação de 50 a 80 kg/ha de P₂O₅ pode ser suficiente para promover um ótimo estabelecimento e aumentar gradativamente os rendimentos de forragem.

A utilização de plantas forrageiras que demandem grandes quantidades de nutrientes, tais como capim-colonião, pasto imperial, capim-elefante, grama-estrela, leucena, guandu, dentre outras, poderá dar início ao processo de diminuição da fertilidade do solo, implicando em menor produtividade da pastagem e, por conseguinte da sua capacidade de suporte, desde que não sejam realizadas adubações periódicas (anuais ou bianuais) de manutenção. Dentre os fatores que mais afetam a produtividade e persistência das pastagens, destacam-se a utilização de germoplasma pouco adaptado às condições edafoclimáticas do trópico úmido e a adoção de práticas de manejo inadequadas (carga animal e sistema de pastejo). Para as condições ecológicas da Amazônia Ocidental, as plantas forrageiras recomendadas para a formação de pastagens em solos originalmente de baixa a média fertilidade natural são:

Gramíneas – *Anogon gayanus* cv. Planaltina, *Brachiaria brizantha* cv. Marandu, *Paspalum guenoarum*, *P. atratum* cv. Pojuca, *P. coryphaeum*, *Axonopus scoparius* e *Tripsacum australe*.

Leguminosas – *Arachis pintoi*, *Stylosanthes*, *Desmodium ovalifolium*, *Centrosema macrocarpum*, *C. Brazilianum*, *Zornia latifolia*, *Calopogonium mucunoides*, *Pueraria phaseoloides*, *Leucaena leucocephala*, *Cajanus cajan*.

Com relação ao manejo das pastagens, deve-se sempre evitar o superpastejo (número excessivo de animais por área). Quando possível, fazer a divisão das pastagens e utilizar o pastejo rotativo. No caso da adição do pastejo contínuo, dar pelo menos um a dois meses de descanso nas pastagens durante o ano. Outra prática de grande importância consiste na diversificação das espécies na pastagem. Devido a grande variação existente entre as plantas forrageiras quanto aos requerimentos nutricionais, produção estacional de forragem, valor nutritivo, tolerância às pragas e doenças, além da produção durante o período de estiagem, com este procedimento haverá um melhor aproveitamento das potencialidades de cada espécie. Quanto ao uso de leguminosas, sugere-se duas maneiras: consorciadas diretamente com as gramíneas ou a formação de bancos-de-proteína, que consiste no plantio isolado da leguminosa. Como estas sentem menos os efeitos da estiagem, tem-se durante o período de seca, alimento de excelente qualidade e em quantidades satisfatórias.

Newton de Lucena Costa (Embrapa Amapá), João Avelar Magalhães (Embrapa Meio Norte), Claudio R. Townsend,

Ricardo Gomes de A. Pereira (Embrapa Rondônia)

⚠ Atenção: Para comentar esse conteúdo é necessário ser cadastrado, faça seu cadastro gratuito.

- Clicar no botão **Entrar** caso já possua cadastro no Agrolink
- Se não tiver cadastro ainda em nosso site **Cadastre-se (/cadastro/novo)** gratuitamente e terá acesso a conteúdos exclusivos
- **Clique aqui (/login)** todas as vantagens de fazer seu cadastro no Agrolink

Recomendados para Você

(https://www.outbrain.com/what-is/default/pt)



Empreendedor criou um negócio de sucesso na internet
Negócio em 21 Dias

(http://www.negocioem21dias.com.br/video-aula?utm_source=Outbrain&utm_term=Neg%C3%B3cio+em+21+dias&utm_campaign=outbrain1&utm_content=00fd929cee55304c27092f298f176502f)



Conheça o Seguro de Carro que não pesa no seu bolso
Seguro Auto

(http://optarget.leadspedia.com/?c=438&lp=154)




Aprenda a obter renda através do futebol
Aprenda a Lucrar com Seu Esporte Favorito

(https://www.investmentfutebol.com/go2/outgo2.php?utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=Investidor26)utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=Investidor26




Quer trabalhar em casa? Veja como começar em 21 dias
Negócio em 21 Dias

(https://gohotmart.com/0551e6098?ap=e987&src=outbrain1&utm_source=Outbrain&utm_term=Como+criei+um%C3%B3cio+de+sucesso+em)utm_source=Outbrain&utm_term=Como+criei+um%C3%B3cio+de+sucesso+em



Empiricus Research

(http://lp.empiricus.com.
/tesouro-direto
/?xpromo=XE-MEL-OB-
TD-X-X-PP-2-X&
utm_medium=outbrain&
utm_source=outbrain&
utm_campaign=lg_tesou



Empiricus Research

http://p.empiricus.com.
/fique-rico-com-
dividendos
/?xpromo=XE-MEL-OB-
DI-X-X-NTV-X-
D&utm_medium=outbrain
redir=source&utm_source=outbrain&



IBC Coaching

http://rd.adireto.com
/r/6/1
/?utm_source=adireto
utm_campaign=IBC_c
utm_term=Artigo+%7



Guia Mais Curiosidades

```
(http://trackerx.net
/cem-dt?src=OBC18G2MI41
&ad=G2MI41&
channel=G2M&
+ImageCr=42)&
utm_medium=0031206715
trafficsource=OB&
product=CEM&
campaign=CEM18&
site=00312067154075b21k
```



**O Portal do
Conteúdo
Agropecuário.**

INSTITUCIONAL SEÇÕES

Sobre nós

Fale Conosco
(/faleconosco)

Serviços
(/comercial
/servicos)

Anuncie aqui
(/comercial)

Conteúdo
gratuito
(/comercial
/conteudo-
gratuito)

Cotações
(/cotacoes)

AgrolinkFito
(/agrolinkfito)

Notícias
(/noticias)

Culturas
(/culturas)

Assine o nosso Clipping Agropecuário



Curta nossas páginas nas redes sociais



Copyrights © 2017 Todos os
direitos reservados

[Termos de uso /](#)
[Política de privacidade](#)

✉ contato@agrolink.com.br